Посиндромные укладки - 12 синдромов

Укладка состоит из перевязочных и лекарственных средств. Рассчитана на купирование брадикардии, судоржного синдрома, нарушение терморегуляции и др.

Набор "Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов" - 10 синдромов

Товары в Аптечке

№	Состав	Кол-во
1.	бинт марлевый мед. стерильный 5х10 см инд. уп.	1 Шт
2.	бинт марлевый мед. нестерильный 5х10 см инд. уп.	1 Шт
3.	бинт марлевый мед. стерильный 5х7 см инд. уп.	1 Шт
4.	бинт марлевый мед. нестерильный 5х7 см инд. уп.	1 Шт
5.	бинт марлевый мед. стерильный 7х14 см инд.уп.	1 Шт
6.	бинт марлевый мед. нестерильный 7х14 см инд.уп.	1 Шт
7.	бинт марлевый мед. эластичный ВР 8х3 см	1 Шт
8.	вата хирургическая стерильная гигроскопическая 25 г	1 Шт
9.	лейкопластырь рулонный 2х500 см	1 Шт
10.	лейкопластырь бактерицидный № 20 набор бежев.	1 Набор
11.	лейкопластырь Силкопласт № 20 стандарт	1 Уп
12.	пакет-контейнер охлаждающий гипотермический	1 Шт
13.	салфетки спиртовые стерильные 13,5х18,5 см №7 инд.уп.	1 Уп
14.	салфетки медицинские 2-х слойные стерильные 16х14 № 10 инд. уп.	1 Уп
15.	воздуховод (устройство рот-в-рот)	1 Шт
16.	губка гемостатическая коллагеновая 50х50 мм № 1	1 Шт
17.	жгут кровоостанавливающий резиновый тип Эсмарха	1 Шт
18.	покрывало спасательное изотермическое р-р 160х210 см	1 Шт
19.	ножницы для разрезания повязок	1 Шт
20.	маска медицинская НЕстерил. 3-х слойная на резинке № 3	1 Уп
21.	перчатки медицинские хирургические стерильные латексные р-р 8	1 Пара
22.	аммиак 10% 40 мл № 1 р-р для наружн. применения	1 Флакон
23.	перекись водорода 3% 100 мл в пластиковом флаконе	1 Шт
24.	бриллиантовый зеленый 1% 20 мл флакон с кистью	1 Шт
25.	йод 5% 20 мл флакон	1 Шт
26.	Хлоргексидина биглюконат 0,05% 100 мл раствор для местн. прим	1 Шт
27.	блокнот	1 Шт
28.	авторучка	1 Шт
29.	английские булавки 38 мм	3 Шт
30.	анальгин 500 мг № 10 таб.	1 Уп

31.	ацетилсалиц кислота 500мг №10таб.	1Уп
32.	валериана П № 50 драже/табл	1 Уп
33.	валидол 60 мг № 10 таб.	1 Уп
34.	лоперамид 2 мг № 20 таб.	1 Уп
35.	но-шпа 40 мг № 6 таб.	1 Уп
36.	парацетомол 500 мг № 10 таб.	1 Уп
37.	цитрамон П № 10 таб.	1 Уп
38.	тавегил 1 мг № 10 таб.	1 Уп
39.	уголь активирован 250 мг № 50 таб.	1 Уп.
-	Футляр (контейнер) полипропиленовый с прочными замками (фиксаторами для запирания)	№1

Сопроводительная документация (входит в состав):

- РУ,СС, ДС отдельно на каждое изделие (в соответствии с установленными требованиями на территории РФ к определенному виду товара)
- телефоны экстренных служб

Рекомендуется к использованию по назначению при 12 следующих синдромах:

1. Гипогликемическая кома
2. Бронхиальная астма
3. Анафилактический шок
4. Нарушение сердечного ритма
5. Острая коронарная недостаточность
6. Отек легких
7. Гипертонический криз
8. Судорожный синдром
9. Нарушение терморегуляции
10. Судорожный синдром (педиатрия)
11. Бронхиальная астма (педиатрия)
12. Анафилактический шок (педиатрия)